

Scan the QR code or visit kirkh.org for product information.



UNIMMAP

DIRECTIONS: Take one tablet daily with food, or upon retiring. Not to be chewed. Do not exceed recommended dose.

STORAGE: Do not repackage. Keep in original container, below 30° C, protect from light and moisture. **Keep out of reach and sight of children.**

MODE D'EMPLOI : Prenez un comprimé par jour avec de la nourriture ou au coucher. Ne pas mâcher. Ne pas dépasser la dose recommandée.

CONSERVATION : Ne pas reconditionner. A conserver dans l'emballage d'origine, à une température inférieure à 30° C, à l'abri de la lumière et de l'humidité. **Tenir hors de portée et de vue des enfants.**

Multiple Micronutrient Supplement for Pregnant & Breastfeeding Women

Supplémentation en micronutriments multiples pour les femmes enceintes et allaitantes

180 tablets/comprimés

WHO/UNICEF Formulation

Supplement Facts

Serving Size: 1 Tablet

Amount Per Serving		%Daily Value*
Vitamin A (as Retinyl Acetate)	800 mcg RAE	62%
Vitamin C (as Ascorbic Acid)	70 mg	58%
Vitamin D (as Cholecalciferol)	5 mcg (200 IU)	33%
Vitamin E (as d- α -Tocopheryl Succinate)	10 mg α -TE	53%
Vitamin B-1 (as Thiamine Mononitrate)	1.4 mg	100%
Vitamin B-2 (Riboflavin)	1.4 mg	88%
Vitamin B-3 (as Niacinamide)	18 mg NE	100%
Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl)	1.9 mg	95%
Folate (as Folic Acid)	680 mcg DFE (400 mcg)	113%
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin)	2.6 mcg	93%
Iron (as Ferrous Fumarate)	30 mg	111%
Iodine (as Potassium Iodide)	150 mcg	52%
Zinc (as Zinc Oxide)	15 mg	115%
Selenium (as Sodium Selenite)	65 mcg	93%
Copper (as Cupric Oxide)	2 mg	154%

*Daily Value (DV) for Pregnant and Lactating Women, as established by the U.S. FDA.

OTHER INGREDIENTS: Microcrystalline Cellulose, Dicalcium Phosphate, Croscarmellose Sodium, Magnesium Stearate, Silica, Starch, Polyvinylpyrrolidone, Sucrose, Acacia, Crospovidone, Hypromellose, Polyethylene Glycol, Triglycerides, Tocopherols, Sodium Ascorbate and Tricalcium Phosphate.

WARNING: Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. **Keep this product out of the reach of children.** In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.

AVERTISSEMENT : Le surdosage accidentel de produits contenant du fer est l'une des principales causes d'empoisonnement mortel chez les enfants de moins de 6 ans. **Gardez ce produit hors de portée des enfants.** En cas de surdosage accidentel, appelez immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

MFG DATE:

EXP DATE:

LOT#:

Manufactured in the USA by Contract Pharmacal Corp., Hauppauge, NY 11788 + 1 631-231-4610

R54104
NOT FOR SALE